


Skúlin við Løgmannabreyt
Karlamagnusarbreyt 47
FO-188 Hoyvík

1. oktober 2019

Information om fåresyge

Der er konstateret fåresyge hos et barn i Skúlin við Løgmannabreyt. Vi anbefaler at I sender vedlagte brev eller laver et opslag til forældrene hos børn der går i Skúlin við Løgmannabreyt.

Med venlig hilsen



Lars Fodgaard Møller
Landslæge

Sagsnr. 1-1217-854/1/

Reference LMI

T +4572229191

E

Styrelsen for Patientsikkerhed
Landslæknin

Amtmansbrekkan 6
FO-100 Tórshavn
Færøerne
Tlf +298 660 400
Email foe@stps.dk

www.landslaeknin.fo

Til forældre

1. oktober 2019

Information om fåresyge

Der er konstateret fåresyge hos et barn i Skúlin við Lögmannabreyt.

Det anbefales:

Har man fulgt det færøske børnevaccinationsprogram, kan man regne sig for beskyttet mod føresyge.

Der er risikoen for at få fåresyge størst, hvis man ikke er vaccineret mod fåresyge, eller hvis man ikke har haft sygdommen.

Det anbefales at de børn, der ikke har fået deres MFR-vaccination (dækker mæslinger, fåresyge og røde hunde), bliver vaccineret hos deres praktiserende læge. Desuden anbefales det at være opmærksomme på symptomer på fåresyge inden for de nærmeste uger (se symptomer nedenfor). Opstår der symptomer på fåresyge i denne periode anbefales kontakt til den praktiserende læge eller vagtlæge.

Symptomer på fåresyge:

Symptomerne starter typisk med ca. 1 døgn varende tiltagende utilpashed, stigende temperatur og tiltagende trykkende fornemmelse ved kæbevinklerne. De følgende dage udvikles en dejagtig hævelse af den ene eller begge ørespytkirtler, som sidder foran ørerne og oftest giver svære smerter. Almentilstanden og feberens højde kan variere en del, men i svære tilfælde er der høj feber og påvirket almentilstand i et par dage, og sygdommen er en uges tid om at klinge af. En komplikation til fåresyge er meningitis (hjernehinde betændelse), som opstår 3-10 dage efter sygdomsudbrud, og giver høj feber, hovedpine og lysskyhed. På trods af de ubehagelige symptomer er denne virale meningitis ofte fredelig og efterlader kun yderst sjældent varige mén.

Det er vigtigt at alle børn vaccineres da fåresyge hos voksne mænd kan give sterilitet.

Lars Fodgaard Møller
Landslæge

Styrelsen for Patientsikkerhed
Landslæknin

Amtmansbrekkan 6
FO-100 Tórshavn
Færøerne
Tlf. +298 660 400
Email foe@stps.dk

www.landslaekning.is